

Note à l'attention des biologistes participants à l'étude pilote SCORE2

Paramétrage du bilan lipidique spécifique dans le SGL

Les éléments habituels du bilan :

- Aspect à jeun
- Cholestérol total
- Cholestérol HDL
- Cholestérol LDL

Les éléments à rajouter (éléments éditables sur le compte-rendu)

- **Statut tabagique** : saisie manuelle avec 2 possibilités de textes codés : OUI/NON
- **Pression artérielle systolique** (unité mm Hg, saisie manuelle, sans décimale). Dans la zone de paramétrage réservée à la technique, insérer le libellé suivant : **Mesurée au laboratoire par tensiomètre électronique huméral à brassard en position assise après quelques minutes de repos**
- **Evaluation du risque cardiovasculaire SCORE2** : unité %

Le tableau de risque

SCORE2	Moins de 50 ans	50-69 ans
Risque bas/modéré	< 2.5%	< 5%
Haut risque	2,5 à 7,5%	5 à 10%
Très haut risque	Supérieur à 7,5%	Supérieur à 10%

Commentaire fixe de fin de bilan :

Le calcul du SCORE2 est effectué ponctuellement dans le cadre d'une opération de prévention cardiovasculaire organisée conjointement par votre laboratoire et l'URPS HDF

Le SCORE2 évalue la prédiction du risque cardiovasculaire selon les modalités et en accord avec les recommandations formulées par la société Européenne de Cardiologie en 2021. Il vise à adapter la prise en charge en matière de prévention selon la catégorie de risque par le médecin référent.

Les conseils de prévention cardiovasculaire sont applicables à tous (arrêt du tabagisme, recommandations sur le mode de vie, sédentarité, et baisse de la pression artérielle systolique). La décision d'un éventuel traitement médicamenteux est à discuter avec le médecin référent selon le niveau de risque, les antécédents personnels et familiaux et le contexte clinique.

En cas d'hypertension constatée au laboratoire, en raison d'une possible surestimation liée à l'effet « blouse blanche », il est recommandé de contrôler la pression artérielle selon les conseils du médecin traitant par automesure. Dans ce cas, le risque estimé SCORE2 peut être surévalué en raison de la pression artérielle mesurée.

Modalité de recueil des informations cliniques et encodage dans le SGL

Recueil du consentement

Faire signer et archiver dans Le SIL le document de consentement

Statut tabagique

Ce statut ne concerne que la consommation de tabac (cigarette, pipe, cigare), et non la cigarette électronique (voir fiche préleveur)

Pression artérielle systolique

Elle doit être prise après le prélèvement sanguin, en position assise après quelques minutes de repos afin de minimiser l'effet blouse blanche et que le stress d'appréhension de la pique soit passé.